

EC FERTİLİZER
BOR (B) ve ÇİNKO (Zn)
MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
DOĞATECH-BOROZİNC

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :	%W/W
Suda Çözünür Bor (B)	8
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA İle Şelatlı	1
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralığı Çinko (Zn) için	3-7

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	DOZ gr/da	UYGULAMA ZAMANI VE SAYISI
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik, tritikale	150	Kardeşlenmeden itibaren 1-3 sefer uygulama yapılır.
Pamuk, Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Patates, Soğan	200 1 veya 2 uygulama	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Mısır, tütün, Kolza, Yonca, Korunga Yeşil Alan	200 gr / 100 lt su	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Bamyacı, Pırasa	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Marul, Kereviz, Brokoli, Lahana, Karnabahar, Ispanak, Tere, Roka, Maydanoz, Nane, Kuşkonmaz, Şerbetçiotu, Turp, Enginar, Çilek, Mercimek, Nohut, Fiğ, Bezelye, Bakla, Fasulye, Kesme Çiçekçilik	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır. İhtiyaca göre 7-15 gün aralıklarla tekrar uygulama yapılır.
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Üzüm, Narenciye, Ayva, Fındık, Antepfıstığı, Nar, Zeytin, İncir, Muz, Avakado, Kivi, Erik, Ceviz, Gül	200	Tüm meyvelerde hasat sonrası ve yaprak oluşumunun başlamasını takip eden dönemlerde 1-2 uygulama şeklinde yapraktan uygulanmalıdır.

UYARILAR

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Önce etiketi okuyunuz, evde kullanmayınız.
- Gübre buharını tenefüs etmeyiniz.
- Gübreleme esnasında hiçbir şey yemeyiniz.
- Sigara içmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol suyla yıkanmalı, eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha etmeli ve başka bir amaç için kullanmamalıdır.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



KARISABİLİRLİK: Ürün, bilinen bir çok insektisit, fungusit, yaprak gübresi ile karıştırılabilir. Polisülfür, mineral yağlar ve ağır alkali bileşikler ile karıştırmayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI +5/+35 °C arasında stabildir. Havayla intibak eden serin, kuru, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde saklayınız.

FİRMA BEYANI Firmamız yalnız ürün içeriğinden sorumludur ve bu ürünün yanlış, uygun olmayan kullanımından doğabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tescil No: Lisans No: Üretim Tarihi:
Son Kullanma Tarihi Parti No: Net Ağırlık: **0,25-0,5-0,8-1-2-2,5-3-4-5-10-15-20-25-30-50 kg**

ÜRETİCİ FİRMA : DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ.

ADRES: Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı No:63P MELİKGAZI/ KAYSERİ

Tel ve Fax: 0(352) 5030022

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
YILDIRIM BEYAZIT MAH. AŞIK VEYSEL BLV. NO:63/P
MELİKGAZI / KAYSERİ
MİMARŞİMAN V.D. 3081055029