

EC FERTİLİZER
ÇİNKO ŞELATI - EDTA
DOĞATECH-ÇİNKO 13

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :	%W/W
Suda Çözünür Çinko (Zn)	13
EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	10,4
EDTA Şelatının stabil olduğu pH aralığı Çinko (Zn) için	3-7

KLOR İÇERİĞİ (Cl)	% 0,8
--------------------------	--------------

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

BİTKİ	DOZ gr/da	UYGULAMA ZAMANI VE SAYISI
Buğday, Arpa, Yulaf, Çeltik	150	Kardeşlenmeden itibaren 1-3 sefer uygulama yapılır. Tohuma kaplamada 1 ton tohum için önerilen miktar
Pamuk, Şeker Pancarı, Ayçiçeği, Patates, Soğan	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Mısır, tütün, Kolza, Yonca, Korunga, Bamya Yeşil Alan	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kabak, Kavun, Karpuz, Bamya, Pırasa	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır.
Marul, Kereviz, Brokoli, Lahana, Karnabahar, Ispanak, Tere, Roka, Maydanoz, Nane, Kuşkonmaz, Şerbetçiotu, Turp, Enginar, Çilek, Mercimek, Nohut, Fiğ, Bezelye, Bakla, Fasulye, Kesme Çiçekçilik	200	Yaprak oluşumundan itibaren 1-2 defa yapraktan uygulama yapılır. İhtiyaca göre 7-15 gün aralıklarla tekrar uygulama yapılır.
Kavun, Karpuz	200	Meyve oluşumu ile hasat arasında kalan zaman içinde 7 gün arayla 2-3 kez uygulayınız.
Elma, Armut, Şeftali, Kayısı, Kiraz, Üzüm, Narenciye, Ayva, Fındık, Antepfıstığı, Nar, Zeytin, İncir, Muz, Avakado, Kivi, Erik, Ceviz, Gül	200	Tüm meyvelerde hasat sonrası ve yaprak oluşumunun başlamasını takip eden dönemlerde 1-2 uygulama şeklinde yapraktan uygulanmalıdır.

UYARILAR

- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranını aşmayınız ve sadece gerekli yerlerde kullanınız.
- Gübre buharını tenneffüs etmeyiniz.
- Gübreleme esnasında hiçbir şey yemeyiniz.
- Sigara içmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- İstenmeyen durumlarda temas bölgesi acilen bol suyla yıkanmalı, eğer bir tahriş gözlenirse doktora başvurulmalıdır.
- Boş ambalajları usulüne uygun imha etmeli ve başka bir amaç için kullanmamalıdır.
- Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



_TAHRIŞ EDİCİDİR

KARISABİLİRLİK: Ürün, bilinen bir çok insektisit, fungusit, yaprak gübresi ile karıştırılabilir. Polisülfür, mineral yağlar ve ağır alkali bileşikler ile karıştırmayınız.

DEPOLAMA ŞARTLARI +5/+35 °C arasında stabildir. Havayla intibak eden serin, kuru, ısı kaynaklarından ve direkt güneş ışığından uzak yerlerde saklayınız.

FİRMA BEYANI Firmamız yalnız ürün içeriğinden sorumludur ve bu ürünün yanlış, uygun olmayan kullanımından doğabilecek herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

Tescil No:

Lisans No:

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi

Parti No:

Net Ağırlık:

ÜRETİCİ FİRMA : DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ.

ADRES: Yıldırım Beyazıt Mah. Aşık Veysel Bulvarı No:63P MELİKGAZI/ KAYSERİ

Tel ve Fax: 0(352) 5030022

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Sebahat ULUŞAN
Ziraat Mühendisi
DOĞATECH ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
YILDIRIM BEYAZIT MAH. AŞIK VEYSEL BLV. NO:63 /P
MELİKGAZI / KAYSERİ
MİMARŞİMAN V.D. 3081055029